

Programma di monitoraggio della funzionalità epatica con agomelatina

Agomelatina 25 mg

- Prima della dose iniziale a 25 mg

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 3

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 6

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 12

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 24

ALT	U/L
AST	U/L

Effettuare i test in qualsiasi momento se clinicamente giustificato.

- In caso di aumento del dosaggio a **50 mg**, ricominciare il programma di monitoraggio.
- Dose iniziale a 50 mg

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 3

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 6

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 12

ALT	U/L
AST	U/L
- Settimana 24

ALT	U/L
AST	U/L


Effettuare i test in qualsiasi momento se clinicamente giustificato.

Paziente: _____

Data di inizio: _____

ALT = alanina aminotransferasi
AST = aspartato aminotransferasi

Sintomi o segni di potenziale danno epatico *



* Come ad esempio urine scure, feci di colore chiaro, ingiallimento della pelle/occhi, dolore nella regione superiore destra dell'addome, senso di prolungata ed inspiegabile stanchezza di nuova insorgenza